



RATICIDE SOURICIDE EN GRAINS



- ▶ **Formulation grains prête à l'emploi.**
- ▶ **Destiné au traitement à l'intérieur et l'extérieur autour des bâtiments.**
- ▶ **Le produit est utilisé pour lutter contre les rats et les souris, du stade juvénile au stade adulte.**
- ▶ **Agit par anticoagulation et ingestion répétée.**
- ▶ **Contient un agent amérisant et un colorant.**

Utilisateurs : Pour les professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs.

APPLICATION

Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques. Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs. Ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement. Les postes d'appâtage doivent être placés en zone non inondable à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée. Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants et de tous les animaux non cibles, à l'écart des aliments, boissons et toutes surfaces entrant en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité des systèmes d'évacuation des eaux avec risque de contact. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents. L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. Prévenir le fournisseur en cas de non efficacité du traitement ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

Doses et fréquences d'application :

- Contre les rats, intérieur et extérieur : 100g d'appât par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres.

- Contre les souris uniquement à l'intérieur : 40g d'appât espacés de 1 à 2 mètres. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré et/ou contaminé. Ne pas placer directement ce produit dans les terriers. Respecter les doses d'application du produit et les intervalles entre les postes d'appâtage.

Inspecter ces derniers tous les 2 à 3 jours (traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite. Rechargez le poste d'appâtage au besoin.

Chaque poste d'appâtage doit être sécurisé et muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «doit être sécurisé et muni d'une étiquette»; «contient un rodenticide»; «nom du produit ou numéro d'autorisation»; «substance(s) active(s)» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison INRS 01 45 42 59 59». Dangereux pour la faune.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

0725

